

SUBSTRAL

SUBSTRAL

MNISZEK
Zwalcza Chwasty



mlecz



babka



koniczyna

**Bezpieczny
dla
TRAW**

SUBSTRAL

MNISZEK
Zwalcza Chwasty na Trawniku

**Niszczy
Korzenie**



babka



mlecz



koniczyna

MNISZEK ULTRA 070 EW
TRAWNIK

Zawartość substancji czynnych:
MCPA w formie soli potasowej (związek z grupy fenoksykwasów karboksylowych) - **53,4 g/l** (5,21%)
fluroksypyr w formie estru 1-metyloheptylowego (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) - **10,68 g/l** (1,04%)
chloryralid (związek z grupy pochodnych kwasów karboksylowych) - **5,34 g/l** (0,52%)



Uwaga

H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia. P280 - Stosować rękawice ochronne. P302 + P352 - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody/ mydłem. P333+P313 - W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

EVERGREEN
Garden Care

Posiadacz zezwolenia:
Evergreen Garden Care Deutschland GmbH, Wilhelm-Theodor-Römheld-Straße 30 D-55130 Moguncja, Republika Federalna Niemiec

Podmiot wprowadzający środek ochrony roślin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

Evergreen Garden Care Poland Sp. z o.o., ul. Ostrobramska 101 A, 04-041 Warszawa, tel.: 22 465 61 80, fax: 22 465 61 91, e-mail: info@evergreengarden.com

Zawartość netto: 250 ml

Okres ważności: 2 lata
Data produkcji i nr partii:



519074871102621

MNISZEK ULTRA 070 EW

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych
Zezwolenie MRIRW nr R-15/2019wu z dnia 29.03.2019 r.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek jest herbicydem selektywnym o działaniu układowym, pobieranym przez liście a następnie przemieszczanym do innych części roślin, powodując ich deformację, a następnie zahamowanie wzrostu i zamieranie. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach a proces obumierania następuje po tygodniu od zastosowania. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin wzmacnia działanie chwastobójcze środka.

CHWASTY WRAŻLIWE: koniczyna biała.

CHWASTY ŚREDNIOWRAŻLIWE: babka, krwawnik pospolity, mniszek lekarski.

STOSOWANIE ŚRODKA

Trawniki

Środek Mniszek Ultra 070 EW stosować na miejsca zachwaszczone.

**Maksymalna/zalecana dawka: dla jednorazowego zastosowania
150 ml na 5 L wody na 100 m²**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1

UWAGA: W roku założenia trawnika środek stosować w fazie krzewienia traw lub po 2 tygodniach od pierwszego koszenia.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, OKRESY KARENJI I SZCZEGÓLNE WARUNKI STOSOWANIA

Nie stosować środka:

- * na rośliny chore, uszkodzone, mokre lub osłabione suszą,
- * w temperaturze poniżej 10°C i powyżej 25°C,
- * przed zbliżającymi się przymrozkami i deszczem,
- * w ogrodach na liście i młodą korę drzew, krzewów owocowych i ozdobnych ze względu na możliwość ich uszkodzenia,
- * podczas dużego wiatru gdy istnieje możliwość zniesienia środka na inne rośliny.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB STOSUJĄCYCH ŚRODEK, PRACOWNIKÓW ORAZ OSÓB POSTRONNYCH

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek: Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu. Stosować rękawice ochronne (nitrylowe). Unikać zanieczyszczenia skóry.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkami ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczenia wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. Nie dopuścić do znoszenia cieczy użytkowej poza obszar stosowania środka. Zaleca się stosować środek poza okresami aktywności pszczoł oraz innych owadów zapylających. W celu ochrony wód podziemnych środek stosować wyłącznie w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody/mydłem.

W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

PRZED UŻYCIEM PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE PODANE W ZAŁĄCZONEJ ULOTCE.